

ITSS à rechercher selon les facteurs de risque décelés

Adapté au Nunavik

Facteurs de risque X : dépistage recommandé (X) : dépistage recommandé dans certaines situations	Chlamydia	Gonorrhée	Syphilis	VIH	VHB ¹	VHC ²	Mycoplasma genitalium
Critères sociodémographiques, régionaux et facteurs liés aux comportements sexuels							
Personne de 14 ans et plus, sexuellement active ou l'ayant déjà été	X	X	X	X			
Personne ayant un nouveau partenaire sexuel ou en ayant eu plus d'un concurremment depuis son dernier test de dépistage	X	X	X	X			
Personne ayant eu un partenaire anonyme ou plus de trois partenaires sexuels au cours de la dernière année	X	X	X	X			
Personne originaire d'une région où les ITS bactériennes, le VIH, l'hépatite B ou l'hépatite C sont endémiques ³	X	X	X	X	X	X	
HARSAH	X	X	X	X	X	(X ⁴)	
Travailleur ou travailleuse du sexe, ou un de ses clients	X	X	X	X	X		
Personne incarcérée ou l'ayant été	X	X	X	X	X	X	
Personne transsexuelle ou transgenre	(X ⁵)	(X ⁵)	(X ⁵)	X	(X ⁵)		
Personne vivant la rue ou l'ayant déjà été	(X ⁵)	(X ⁵)	(X ⁵)	(X ⁵)	(X ⁵)		
Personne victime de violence sexuelle ou d'abus sexuels	(X ⁵)	(X ⁵)	(X ⁵)	(X ⁵)	(X ⁵)		
Personne ayant recours au sexe pour subvenir à ses besoins	(X ⁵)	(X ⁵)	(X ⁵)	(X ⁵)	(X ⁵)		
Personne ayant des pratiques sexuelles à risque comme des relations sexuelles orogénitales, génitales ou anales non protégées, des relations sexuelles avec échanges sanguins, y compris le sadomasochisme, le partage de jouets sexuels, etc.	(X ⁵)	(X ⁵)	(X ⁵)	(X ⁵)	(X ⁵)		
Personne qui consomme des substances comme l'alcool ou des substances psychoactives (marijuana, cocaïne, ecstasy, méthamphétamine) dans un contexte associé à des relations sexuelles	(X ⁵)	(X ⁵)	(X ⁵)	(X ⁵)	(X ⁵)		
ITSS⁶							
Personne chez qui l'une des infections suivantes a été détectée ⁷ : infection gonococcique, syphilis, lymphogranulomatose vénérienne (LGV), infection par le VIH ⁸ , hépatite B ou hépatite C ⁹	X	X	X	X	X	(X ¹⁰)	
Personne ayant un partenaire chez qui l'une des infections suivantes a été détectée : infection à Chlamydia trachomatis, infection gonococcique, syphilis, LGV, infection par le VIH ¹¹ ou hépatite B ¹²	Dépister l'infection à laquelle elle a été exposée						
Personne atteinte d'une infection à Chlamydia trachomatis : dépister à nouveau l'infection à Chlamydia trachomatis trois à six mois après le traitement en plus de l'infection gonococcique, la syphilis et l'infection par le VIH	X	X	X	X			
Personne atteinte d'une infection gonococcique : dépister à nouveau l'infection gonococcique trois à six mois après le traitement en plus de l'infection à Chlamydia trachomatis, la syphilis et l'infection par le VIH	X	X	X	X			
Personne atteinte d'un syndrome compatible avec une ITSS pour lequel la recherche de l'infection à Chlamydia trachomatis et de l'infection gonococcique s'est révélée négative et pour lequel un traitement syndromique approprié s'est avéré inefficace							X
Personne ayant un partenaire atteint un syndrome compatible avec une ITSS pour lequel la recherche de l'infection à Chlamydia trachomatis et de l'infection gonococcique s'est révélée négative et pour lequel un traitement syndromique approprié s'est avéré inefficace	X	X	X	X			X

Facteurs de risque X : dépistage recommandé (X) : dépistage recommandé dans certaines situations	Chlamydia	Gonorrhée	Syphilis	VIH	VHB ¹	VHC ²	Mycoplasma genitalium
Grossesse¹³							
Femme demandant une interruption de grossesse	X	X	X	X			
Femme enceinte							
a) Bilan prénatal de base (fait chez toutes les femmes enceintes) ¹⁴	X	X	X	X	X	(X ¹⁵)	
b) 1 ^{ère} visite, 2 ^e trimestre (6-8 semaines après le premier dépistage), vers 24-28 semaines et vers 34-36 semaines			X				
c) 6 à 8 semaines en post-partum ¹⁶			X				
d) En présence d'une exposition, de comportements à risque chez la femme enceinte ou chez son partenaire : dépister à nouveau les ITSS	X	X	X	X	X	(X ¹⁵)	
Exposition à du sang ou à d'autres liquides biologiques							
Personne ayant consommé des drogues par injection ou par inhalation, même une seule fois				X	X	X	
Personne exposée à du sang ou à d'autres liquides biologiques potentiellement infectés (tatouage ou perçage dans des conditions non stériles, exposition en milieu de travail ou exposition dans un contexte non professionnel) ¹⁷				X	X	X	
Personne ayant subi des procédures (chirurgicales ou autres) avec du matériel contaminé dans des régions où la prévalence du VIH, de l'hépatite B ou de l'hépatite C est élevée ³				X	X	X	
Personne ayant reçu soit une transfusion de sang ou de produits sanguins, soit une greffe de cellules, de tissu ou d'organe				(X ¹⁸)	(X ¹⁸)	(X ¹⁸)	
Facteurs de risque des partenaires sexuels							
Personne qui, depuis son dernier test de dépistage, a eu un partenaire ayant eu lui-même un nouveau partenaire sexuel ou en ayant eu plus d'un concurremment	X	X	X	X			
Personne dont le partenaire a eu un partenaire anonyme ou plus de trois partenaires sexuels au cours de la dernière année	X	X	X	X	X		
Personne qui a eu un partenaire originaire d'une région où les ITS bactériennes, le VIH, l'hépatite B ou l'hépatite C sont endémiques ³	X	X	X	X	X		
Femme dont le partenaire est un homme ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes	X	X	X	X	X		
Personne ayant pour partenaire soit un travailleur ou une travailleuse du sexe, soit un client d'un travailleur ou d'une travailleuse du sexe	X	X	X	X	X		
Personne dont le partenaire est incarcéré ou l'a été	X	X	X	X	X		
Personne dont le partenaire est une personne transsexuelle ou transgenre	(X ⁵)	(X ⁵)	(X ⁵)	X	(X ⁵)		
Personne dont le partenaire a utilisé des drogues par injection ou par inhalation, même une seule fois				X	X		
Personne dont le partenaire reçoit des services dans un centre de ressources en dépendance à des drogues				X	X		
Autres							
Personne demandant un dépistage après avoir reçu l'information prétest, même en l'absence de facteur de risque dévoilé	Rechercher les infections pour lesquelles la personne demande un dépistage						
Personne recevant des services dans un centre de ressources en dépendance à des drogues				X	X	X	
Personne sous hémodialyse					X	X	

ITSS à rechercher selon la région d'origine				
Région d'origine	ITS Bactériennes	VIH	VHB	VHC
Nunavik	X			
Nunavut	X			
Afrique du Nord ou Moyen-Orient			X	Seulement : Égypte et Syrie
Afrique subsaharienne	X	X	X	Seulement de la partie centrale
Amérique latine ou Caraïbes	X	Caraïbes	Région de l'Amazonie	
Asie du Sud ou du Sud-Est	X	Thaïlande	X	Seulement : Taiwan et Pakistan
Océanie		Papouasie-Nouvelle-Guinée	X	
Europe de l'est ou Asie Centrale		X	Sud de l'Europe de l'Est	X
Europe			Sud de l'Europe centrale	Seulement de la Roumanie
Notes				
1. À moduler selon le statut immunitaire de la personne, en tenant compte de l'âge de celle-ci au moment de la vaccination, des risques d'avoir été exposée à l'hépatite B avant le moment où elle a été vaccinée et de maladies sous-jacentes susceptibles de diminuer sa réponse au vaccin.				
2. La transmission sexuelle de l'hépatite C dans les couples hétérosexuels est rare et la transmission aux contacts domiciliaires n'a pas été démontrée; le dépistage peut toutefois être offert aux partenaires sexuels et aux contacts domiciliaires, selon le jugement clinique.				
3. Voir la section « ITSS à rechercher selon la région d'origine ».				
4. Rechercher l'hépatite C s'il s'agit d'un HARSAH : <ul style="list-style-type: none"> • vivant avec le VIH : dépister à nouveau l'hépatite C chez tout HARSAH vivant avec le VIH qui a des relations sexuelles anales sans condom; • à qui on envisage de prescrire PrEP ou qui en reçoit une. 				
5. Rechercher cette infection en fonction des autres facteurs de risque décelés.				
6. Le dépistage est recommandé au moment où une ITSS est détectée. Il est aussi indiqué d'offrir des tests de dépistage à toute personne qui a été atteinte d'une ITS antérieurement et qui n'a pas subi alors les autres tests de dépistage recommandés.				
7. S'il s'agit d'une autre infection (ex. : infection à Chlamydia trachomatis, herpès génital ou infection par les virus du papillome humain), prendre les autres facteurs de risque en considération pour déterminer quelles ITSS il faut rechercher.				
8. Consulter le guide pour les professionnels de la santé du Québec intitulé L'examen médical périodique de l'adulte vivant avec le virus de l'immunodéficience humaine (VIH) (MSSS, 2014, 142 p.).				
9. S'il s'agit d'une hépatite C, rechercher l'hépatite B et le VIH.				
10. Rechercher l'hépatite C seulement si la personne est infectée par le VIH ou atteinte d'une LGV (à cause de la co-infection LGV et VIH fréquente), ou si elle a possiblement contracté l'hépatite B par voie sanguine.				
11. Pour de l'information sur les partenaires à joindre et les autres interventions préventives à effectuer en cas d'infection à Chlamydia trachomatis, d'infection gonococcique, de syphilis, de LGV ou d'infection par le VIH, consulter l'outil Soutenir la personne atteinte d'une ITSS pour qu'elle avise ses partenaires.				
12. Pour de l'information sur les partenaires sexuels et les contacts domiciliaires à joindre ainsi que sur les autres interventions préventives à effectuer en cas d'hépatite B, consulter le Protocole d'immunisation du Québec (MSSS) et le Guide d'intervention sur l'hépatite B (MSSS, 2 ^e édition, 2014, 72 p.).				
13. Le dépistage est recommandé, compte tenu des complications importantes possibles pouvant affecter la santé de la femme, l'issue de la grossesse ou la santé du nouveau-né.				
14. Répéter le dépistage au moment de l'accouchement, au besoin.				
15. Rechercher l'hépatite C en présence de facteurs de risque associés à cette infection avant ou pendant la grossesse.				
16. Permet le dépistage de la syphilis en fin de grossesse.				
17. Consulter le Guide pour la prophylaxie et le suivi après une exposition au VIH, au VHB et au VHC (MSSS, 2019, 98 p.).				
18. Au Canada, avant 1970 pour l'hépatite B, avant octobre 1985 pour le VIH et avant avril 1992 pour l'hépatite C. Pour connaître les recommandations précises en matière de biovigilance, consulter la Direction de la santé publique.				
19. Se référer aux protocoles et aux procédures propres à chaque centre d'hémodialyse.				