

Titre	Effets indésirables des principaux antituberculeux
CODE de Boîte à outils TB	DSPu-TB TB ACT-ITL-EFFETS-INDESIRABLES
Date de modification	2025-06-01

Médicament	Effets indésirables courants	Effets indésirables rares, mais importants	Risque d'hépatite*	Risque de rash*
Isoniazide (INH)	▪ Rash ▪ Hépatite ▪ Neuropathie périphérique	▪ Neurotoxicité ▪ Anémie ▪ Nécrose hépatique	+++	++
Rifampicine (RMP)	▪ Interactions médicamenteuses ▪ Rash ▪ Coloration orangée des liquides corporels ▪ Anémie	▪ Hépatite ▪ Syndrome d'allure grippale ▪ Neutropénie ▪ Thrombocytopénie	++	++++
Pyrazinamide (PZA)	▪ Hépatite ▪ Rash ▪ Hyperuricémie ▪ Arthralgie	▪ Goutte	++++	+++
Ethambutol (EMB)	▪ Neuropathie optique (acuité visuelle, discrimination axe rouge-vert)	▪ Rash ▪ Neurotoxicité ▪ Troubles GI	+	+
Fluroquinolone (FQN)	▪ Rash	▪ Tendinite ▪ Rupture de tendon ▪ Allongement de l'intervalle QT		
Amikacine (AM)	▪ Néphrotoxicité ▪ Ototoxicité			
Rifapentine (RPT)	▪ Interactions médicamenteuses ▪ Rash ▪ Coloration orangée des liquides corporels ▪ Anémie ▪ Réaction d'hypersensibilité	▪ Syndrome d'allure grippale ▪ Hépatite ▪ Neutropénie ▪ Thrombocytopénie	++	++++

Tiré de *TUBERCULOSE : Gestion par les intervenants de santé publique des cas et de leurs contacts dans la communauté, Guide de pratique professionnelle* (INSPO, 2025).

* ++++ = plus probable/
+ = peu probable

- L'INH, la RPT, RIF et le PZA peuvent provoquer des troubles hépatiques, variant d'une légère élévation asymptomatique des transaminases à une hépatite fulminante.
- Ces médicaments devraient être suspendus et le médecin traitant informé rapidement si :
 - un ictère apparaît;
 - la concentration sérique des transaminases (AST ou ALT) est 3 fois plus élevée que la limite supérieure de la normale et que la personne est symptomatique;
 - la concentration sérique des transaminases (AST ou ALT) est 5 fois plus élevée que la limite supérieure de la normale (avec ou sans symptômes).